



Специализированный продукт диетического  
лечебного питания, витаминно-минеральный комплекс  
на основе железа и витаминов  
(не является лекарственным средством)

#### Форма выпуска:

Таблетки массой 700 мг. По 15, 30, 45, 60, 100, 200 таблеток в пачке картонной с листком- вкладышем.

#### Область применения:

Дополнительный источник железа и витаминов С, В1, В2, В5, В6, В12

**Ферлип®** представляет собой микронизированную микроинкапсулированную форму пиррофосфата железа (Fe3+).

Микронизация - процесс размельчения частиц, ведущий к улучшению всасывания

Микроинкапсуляция - покрытие частиц специальной оболочкой, уменьшающей неблагоприятное воздействие железа на желудочно-кишечный тракт, нежелательное взаимодействие с другими компонентами, включая пищу, и улучшающей его доступность для организма

Эти современные технологии дают Ферлипу следующие свойства, отличающие его от многих других форм железа:

- снижение/отсутствие металлического вкуса
- повышение всасывания/ доступности железа для организма
- уменьшение риска раздражающего действия и нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта

#### Переносимость:

Ферлип® обладает хорошей переносимостью. Отсутствие металлического привкуса во рту, болей и спазмов в животе, тёмного стула позволяет использовать Ферлип® у лиц с дефицитом железа без ограничений по возрасту и физиологическому состоянию.

#### Состав:

Витамин С (L-аскорбиновая кислота), микронизированное микроинкапсулированное железо (пиррофосфат железа на кукурузном крахмале и лецитине подсолнечника), витамин В5 (пантотенат), витамин В2 (рибофлавин), витамин В6 (пиридоксина хлоргидрат), витамин В1 (тиамина хлоргидрат), витамин В9 (фолиевая кислота/кальция L-метилфолат), витамин В12 (цианокобаламин); наполнители: микрокристаллическая целлюлоза, силицированная микрокристаллическая целлюлоза, кальция фосфат, натрия кроскармеллоза, лактоферрин; ингибиторы слеживания: растительный стеарат магния, кремния диоксид.

При приеме Ферлип® в рекомендуемой дозе в организм будет поступать:

Наименование активных компонентов	в 1 таблетке	% от РСП*
Витамин С (L-аскорбиновая кислота)	70,00 мг	117
<b>Железо (пиррофосфат железа)</b>	<b>30,00 мг</b>	<b>214</b>
Витамин В5 (пантотенат)	10,00 мг	167
Витамин В2 (рибофлавин)	2,50 мг	156
Витамин В6 (пиридоксина хлоргидрат)	2,50 мг	125
Витамин В1 (тиамина хлоргидрат)	2,00 мг	143
Витамин В9 (фолиевая кислота/кальция L-метилфолат)	0,40 мг	200
Витамин В12 (цианокобаламин)	4,00 мкг	400

\* % от рекомендуемого уровня суточного потребления (РСП) согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Содержание не превышает верхний допустимый уровень потребления

**Фолиевая кислота** — участвует в делении клеток и способствует нормальному кроветворению; необходима женщинам во время беременности для формирования нервной трубки плода.

**Витамин С** — увеличивает усвояемость железа, предотвращает его окисление, ускоряет гемопоэз, обладает антиоксидантным действием.

**Витамины группы В** — способствуют образованию красных кровяных клеток (эритроцитов), участвуют в метаболических процессах в организме.

**Ферлип®** включается в рацион по назначению врача, например при таких железодефицитных состояниях:

- дефицит железа, железодефицитная анемия;
- анемия при инфекционных заболеваниях;

- кровотечения различного происхождения, в том числе во время менструального цикла;
- повышенная потребность в железе во время беременности, грудного вскармливания, донорства крови, интенсивного роста, вегетарианства, пожилой возраст;
- выпадение волос, связанное с дефицитом железа (телоген миазмы);
- а также иных состояниях, сопровождающихся дефицитом железа.

**Рекомендации по применению:** Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время основного приёма пищи. При выраженном дефиците железа и витаминов группы В рекомендуется увеличить прием до 2-х таблеток.

**Продолжительность приёма:** Согласно рекомендации врача.

**Противопоказания:** Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Примечания:** Ферлип® не является заменой продуктам питания. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу.

**Условия хранения:** Хранить в сухом, защищённом от света месте, недоступном для детей, при температуре от +8 °С до +25 °С.

**Срок годности:** 3 года от даты производства.

**Условия реализации:** Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

**Изготовитель:**

Wikenfarma S.r.l., Via Antonio Genovesi 30, 56028 Localita` La Scala, San Miniato (PI), Италия.

**Импортер:**

ООО «Замбон Фарма», 119002, Россия, г. Москва, Глазовский пер., д. 7.

**Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей:**

Московское Представительство АО «Замбон С.П.А.» (Италия), 119002, Россия, г. Москва, Глазовский пер., д. 7, офис 17.

Тел.: (495) 933-38-30/32

Факс: (495) 933-38-31

**Свидетельство о государственной регистрации:**

№ KZ.16.01.98.004.R.000301.03.25 от 27.03.2025 г.

